

関節リウマチでは7つの生物学的製剤が使用できます。

～2014年4月現在～

それぞれの作用のしかたや使用方法・投与間隔などが異なります。
 身体の状態や生活スタイルに合ったお薬を、医師との相談のうえ選択します。



成分名	アダリムマブ	インフリキシマブ	エタネルセプト		ゴリムマブ	セルトリズムマブベゴル	トシリズマブ		アバタセプト	
商品名	ヒュミラ	レミケード	エンブレル		シンボニー	シムジア	アクテムラ		オレンシア	
作用のしかた	TNF-αの働きを抑える						IL-6の働きを抑える		T細胞の活性化を調整する	
使用方法	皮下注射	点滴	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	点滴	皮下注射	点滴	皮下注射
どこで 使用するか	クリニック内	クリニック内	クリニック内		クリニック内	クリニック内	クリニック内	クリニック内	クリニック内	クリニック内
	自宅			自宅		自宅		自宅		
使用間隔	0 初回 シリンジ	0初回	0初回 シリンジ	0初回 ペンタイプ	0初回 シリンジ	0初回 シリンジ	0初回	ペンタイプ	0初回	+ 初回 シリンジ 点滴
	2 週後	2週後	1週後	1週後	4週後	2週後	4週後		2週後	初回 シリンジ
	以後2週毎	6週後 8週毎に	以後1週間に1回 又は1週間に2回	以後1週間に1回	以後4週毎に	4週後 4週に1回2本 2週に1回1本	以後4週毎に		2週に1回	4週後
1回の投与量	40～80mg/1回	体重1Kg当り3～10mg 3～6mg未満/4～8週 6～10mg/8週 (約2時間かけて投与)	25mg・1～2回/週 50mg・1回/週	50mg・1回/週	50mg/1回 または 100mg/1回	200mg～400mg /1回	体重1Kgあたり 8mg/1回 (約1時間かけて投与)	162mg/1回	体重60kg未満500mg 60～100kg:750mg 体重100kg以上 30分かけて投与	125mg/1回
一回の費用 (3割負担の場合)	40mg:19,530 円	2V:53,760 円 (1V増量毎に +26,880 円)	25mg:4,740 円 50mg:9,330 円	50mg: 9,390 円	50mg:37,980 円 100mg:75,950 円	200mg:19,050 円 400mg:38,100 円	40kg: 22,320 円 50kg: 27,210 円 60kg: 32,790 円 70kg: 38,370 円	ペンタイプ:162g 11,790 円	60kg未満:33,000 円 (2バイアル) 100kg以下:49,500 円 (3バイアル) 100kg以上:66,000 円 (4バイアル)	125mg : 8,400 円